



Grandes cultures

Le 29 Juillet 1987

n°14

BETTERAVES : Développement de cercosporiose et d'oïdium

BETTERAVE SUCRIERE

MALADIES

★ Situation

- Cercosporiose : des petits foyers sont observés dans plusieurs parcelles. Les attaques sont localement plus graves dans les situations à risques (nombreuses betteraves sur la parcelle, irrigation). La maladie est particulièrement présente dans l'Allier et aussi dans le Puy-de-Dôme (secteurs d'ISSOIRE, LEZOUX et JOZE).

- Oïdium : faibles attaques pour l'instant en toutes situations.

★ Préconisations

Visiter très régulièrement vos parcelles.

Une intervention est à envisager dès les premiers jours d'Août en cas de présence de cercosporiose et d'oïdium.

Utiliser de préférence un produit polyvalent efficace sur l'ensemble des maladies.

Consulter notre dernier bulletin pour le choix du fongicide.

NOCTUELLES

★ Situation

Plusieurs parcelles présentent des attaques de noctuelles défoliatrices à des degrés divers d'intensité.

★ Préconisations

Intervenir seulement en cas de forte infestation (nombreuses betteraves avec des perforations du feuillage).

Matières actives : deltaméthrine, cyperméthrine.

721